




GATUNKI CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE NADLEŚNICTWA PUŁTUSK

Rezerwat Popławy

CO TO JEST REZERWAT PRZYRODY?

Rezerwat przyrody - obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

NADLEŚNICTWO PUŁTUSK POŁOŻONE JEST W CENTRALNEJ CZĘŚCI KRAJU, W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMUJE CAŁY TEREN POWIATU PUŁTUSKIEGO ORAZ CZĘŚCI POWIATÓW MAKOWSKIEGO, OSTROŁĘCKIEGO I WYSZKOWSKIEGO. NADLEŚNICTWO WCHODZI W SKŁAD REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE. CAŁY OBSZAR NADLEŚNICTWA ZALICZA SIĘ DO DZIELNICY ZWANEJ NIZINĄ PÓŁNOCNOMAZOWIECKĄ, A DOKŁADNIEJ - NASZE LASY ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ NA WYSOCZYŹNIE CIECHANOWSKIEJ, RÓWNINIE KURPIOWSKIEJ, W DOLINIE DOLNEJ NARWI I W MIĘDZYRZECZU ŁOMŻYŃSKIM.





PUSZCZYK

Puszczyk jest to najbardziej pospolita sowa w Polsce, liczna także w miastach np. we Wrocławiu lub w Warszawie. Jest nielicznym ptakiem lęgowym.

Sowa średniej wielkości, krępej budowy ciała. Występuje w dwóch podstawowych odmianach kolorystycznych: białej i szarej.

U odmiany brązowej grzbiet jest brązowy, prążkowany i cętkowany na ciemno- i jasnobrązowo, przez barkówki biegnie biały pas.

Szlara (talerzowato ułożone pióra wokół dzioba i oczu u sów) jednobarwna, rdzawa lub szarawa, obwiedziona ciemnobrązową cienką linią, wokół dzioba, biała, z jasnymi brwiami i wewnętrznymi obwódkami oczu. Liczba jaj waha się od 2 do 6, choć może być też tylko jedno. Puszczyki gnieźdzą się w niewyścielonych dziuplach na wysokości do 10 m.

ORZECHÓWKA


Ptak wielkości gołębia o nieco większej głowie. Obie płcie są ubarwione praktycznie identycznie – orzechówki wyróżniają się wyglądem przypominającym szpaka. Na sporej części ciała orzechówki, upierzenie zawiera szereg małych plamek koloru białego o kształcie kropelek.

Orzechówka składa 2 – 4 jaj.
Umieszczone przy pniu wysokiego świerka w rozwidleniu gałęzi, doskonale ukryte i zamaskowane.



SÓJKA

Ptaka wielkości kawki o beżowobrazowym upierzeniu. Jej ozdobą są błękitne, prążkowane pióra na czarnych skrzydłach. W locie ma charakterystyczną sylwetkę z zaokrąglonymi skrzydłami, białym kuprem i czarnym ogonem. Sójka pełni funkcję "strażnika lasu" alarmując przy każdej okazji wrzaskliwym głosem. Gniazdo- przy nasadzie pnia w koronie drzewa; zbudowane z cienkich patyków, wyścielone korzonkami i trawami. Sójki znoszą od 5 do 7 niebieskozielonych, drobno nakrapianych jaj.



JASZCZURKA ZWINKA



Jest to najbardziej pospolity gad występujący w Polsce. Grzbiet jest brązowy z rzędem plam, w środku każdej plamy jest nieregularna biała plamka. Na udzie po stronie brzusznej znajduje się 11-14 otworów gruczołów zapachowych, które głównie w okresie godowym wydzielają substancję ułatwiającą odnajdywanie się jaszczurek i identyfikację płci.

Jak większość jaszczurek posiada zdolność do regeneracji ogona. Zjada pająki, owady i ślimaki. W okresie od maja do lipca samica składa 3-14 jaj.

ZASKRONIEC

Gatunek niejadowitego węża rodziny połozowatych. Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość do 1,5 m. Żywią się płazami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. Samica składa jaja od czerwca do lipca w liczbie 9–40.

Zaskroniec zawdzięcza swą polską nazwę charakterystycznym żółtawym plamom „za skroniami”.

Plamy te są bardzo wyraźne – pozwalają łatwo rozpoznać ten niejadowity i niegroźny dla człowieka gatunek, otaczają je czarne obwódki. Zaskroniec zwyczajny bardzo lubi przebywać na obszarach podmokłych, bagnistych, niedaleko jezior i bardzo dobrze pływa oraz nurkuje.





PADALEC

to gad należący do jaszczurek. Nie posiada odnóży, ma wężowate ciało. Ogon stanowi połowę długości ciała, ale granica jest słabo zaznaczona. Ogon bardzo łatwo odpada. Nie podlega całkowitej regeneracji. Oczy mają okrągłe źrenice. Ciało pokryte łuskami.

Kolor ciała to brąz w różnych odcieniach. Wzdłuż grzbietu biegną dwie ciemne linie. Linii czasem jest więcej lub wcale. Wyjątkowo spotykana jest odmiana zwana padalcem turkusowym, którego charakteryzują turkusowe plamki na brązowym ciele. Strona brzuszna jest jasnopopielata u samców i ciemnopopielata lub czarna u samic. Zjada owady, ślimaki, dżdżownice. Samica w roku zwykle rodzi od 6 do 16 sztuk (wyjątkowo 26). Młode są od razu zdolne do samodzielnego życia.

ŻMIJA ZYGZAKOWATA

To jadowity gad z rodziny żmijowatych o charakterystycznym, zygzakowatym wzorze na grzbiecie. Ubarwienie jest zmienne. Znamy trzy barwne odmiany: srebrzyste, brązowe (często spotykane) i czarne (bardzo rzadkie). Zygzak widać u dwóch pierwszych odmian, szczególnie u samców. Na głowie znajduje się czarna plama w kształcie litery "X". Strona brzuszna jest ciemna, zwykle brązowa, w okolicy ogona - żółta. Żrenice są szparowate, pionowe. Ciało jest grube i krępe. Zjada gryzonie polne, ryjówki, krety, pisklęta, czasem żaby i jaszczurki. Ofiarę zabija przez ukąszenie i pożera martwą. Samica rodzi od 5 do 18 młodych. Bardzo dobrze pływa. Lubi wygrzewać się na słońcu. Zasadniczo jest zwierzęciem nocnym, ale poluje także w ciągu dnia. To wąż dość powolny.





ROPUCHA ZWYCZAJNA

To pospolity przedstawiciel rodziny ropuchowatych. Ciało jest pokryte brązową skórą z licznymi ciemnymi plamkami, brodawkami z gruczołami jadowymi. Najlepiej są rozwinięte gruczoły jadowe przyuszne. Ciało jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie, kończyny są krótkie i waleczkowate. W kończynach tylnych na spodniej części palca znajdują się dwa rzędy modzeli stawowych. Oczy mają wąskie i poziome źrenice.

Tęczęwki są złociste lub pomarańczowe. Gruba skóra pokryta jest licznymi brodawkami, które mogą być zakończone czarnymi cierniami. Samica potrafi znieść 3000-10 000 jaj.

ŹRÓDŁA:

<http://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/orzechowka>

<http://natura.wm.pl/zwierzeta/118/Puszczyk-zwyczajny>

<http://www.ekologia.pl/ciekawostki/sojka-czy-rzeczywiscie-sojka-wybiera-sie-za-morze,20114.html>

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurka_zwinka

<https://www.medianauka.pl/zaskroniec-zwyczajny>

https://pl.wikipedia.org/wiki/Padalec_zwyczajny

<http://magazyn.salamandra.org.pl/m23a02.html>

<http://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ropucha-szara>

<https://www.youtube.com/watch?v=rbBatJooUkI>

<https://rezerwatygrojec.wordpress.com/about/>

<http://www.pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/polozenie#.WwH03UiFOM8>